

НЕ БОЙТЕСЬ ОПЕРАЦИИ ГЕМОРРОЯ

Геморрой – это варикозное мешкообразное расширение вен, расположенных под слизистой оболочкой анального канала. Различают четыре степени тяжести заболевания.

Часто пациенты жалуются на зуд, боли или кровотечения непосредственно после дефекации.

И хотя этот щекотливый вопрос обычно обсуждается пациентами шепотом, тема геморроя часто затрагивается в связи с ужасными сообщениями о мучениях и болях, связанных с операцией.

Причиной этого является вызываемый почти всеми обычными операционными методами дефект слизистой в чувствительной области заднего прохода. Из-за ожидаемой жгучей боли часто происходит подавление позывов к дефекации, что влечет за собой запоры и повышенное растяжение сфинктера в пораженном сегменте во время следующей дефекации.

При «доплеровском целенаправленном лигировании геморроидальных артерий» (HAL) осуществляется перевязка всех артерий, ведущих к геморроидальным узлам. Вследствие прекращения притока крови геморроидальные узлы рассасываются.

Операционный ректоскоп с закругленным концом сбоку на определенной длине обладает небольшим отверстием размером в четверть объема, перед которым расположен доплеровский зонд.

После его введения в прямую кишку с помощью небольших вращательных движений обнаруживается каждая из геморроидальных артерий, которая затем перевязывается через боковую прорезь с помощью рассасывающейся нити, снабженной иглой.

После безболезненного хирургического вмешательства пациент сразу готов к самостоятельному передвижению, госпитализация при этом не требуется.

В любом случае, перед операцией проводится эндоскопия кишечника, позволяющая исключить другие причины кровотечений или возникновения геморроя.

Сама операция (HAL) проводится без анестезии, но по желанию может быть проведена седация, погружающая пациента в некое «снопоподобное состояние».

Информация:

Гл. врач д-р Кристиан Штраке – врач-хирург

Телефон: +43 (0)699 / 100 555 65

1190 Vienna, Billrothstraße 49a

www.der-chirurg.at - russia@prescan.at